


Амбулаторное обследование и ведение беременных женщин с подозрением или подтвержденным COVID-19

В отличие от гриппа и других респираторных инфекций, и основываясь на ограниченном числе подтвержденных случаев COVID-19, предполагается, что беременные не подвержены более высокому риску тяжелого течения болезни. Тем не менее, учитывая отсутствие данных и опыт лечения других коронавирусов, таких как SARS-CoV и MERS-CoV, тщательность оценки и лечения беременных является оправданной.

Этот алгоритм разработан, чтобы помочь практикующим врачам в быстрой оценке и лечении беременных с подтвержденным контактом и/или симптомами, подходящими под COVID-19. Если вирусы гриппа все еще циркулируют, грипп может быть причиной респираторных симптомов, и практикующим врачам рекомендуется использовать [другой алгоритм ACOG/SMFM](#) для оценки потребности в лечении и профилактике гриппа.

Обращаем ваше внимание, что ситуация с COVID-19 быстро меняется, и это руководство может устареть, как только станет доступной новая информация о COVID-19 у беременных от американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html>



При подозрении на COVID-19 медицинские работники должны немедленно уведомить местное или государственное управление здравоохранения и получить рекомендации по тестированию.