

Список участников:

**никаких стажеров во время реанимации

Розовый код: 1 лицензированный респираторный терапевт

Зеленый код: участвуют лицензированный респираторный терапевт и ординатор/медсестра по сортировке/неонатальный фельдшер и неонатолог

Синий: 3 внутри (лицензированный респираторный терапевт, старший врач, старшая медсестра), 2 снаружи. Необходим предварительный инструктаж.

Ведение новорожденных с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

НОВОРОЖДЕННЫЙ БЕЗ СИМПТОМОВ И МАТЬ СПОСОБНА О НЕМ ПОЗАБОТИТЬСЯ

Ребенок родился у матери с подозрением или подтвержденным COVID-19, которая в силу своих симптомов способна самостоятельно заботиться о новорожденном.

- Соблюдайте меры предосторожности против контактной и каплевой передачи, если не требовалась реанимация/иные, генерирующие аэрозоль процедуры (медицинская маска с визором или медицинская маска, щиток для лица/очки, халат и перчатки)
- Соблюдайте предосторожности против контактной и каплевой передачи, с использованием маски N95, если требовалась реанимация или иные, генерирующие аэрозоль процедуры (реанимационная команда надевает маски N95, щиток для лица/очки, халат и перчатки). **Свяжитесь с отделением по контролю и профилактике инфекций по поводу поставок.**

Бессимптомный новорожденный размещается в одном помещении с матерью, которая за ним ухаживает.
Мазок из носоглотки берется у матери только с подозрением на COVID-19.
Мазок из носоглотки берется у новорожденного.

- Разместите новорожденного с матерью в одноместной палате в подходящем отделении – послеродовом или ОРИТН
- Соблюдайте меры предосторожности против контактной и каплевой передачи вируса
- Следите за симптомами у новорожденного – снимайте показатели жизненно-важных функций каждые 4 часа
- Одобрите кормление грудью после гигиены груди и рук матери
- Мать должна надевать маску во время кормления грудью
- Разместите ребенка на расстоянии 2 метров от матери, в то время, когда она не осуществляет уход за ним
- Планируйте раннюю выписку матери с ребенком, если они хорошо себя чувствуют, и снабдите инструкциями, которым надо следовать в случае изменения их состояния

Если состояние матери меняется и она неспособна ухаживать за новорожденным, см.стр 3

Если у новорожденного появляются **симптомы**, см.стр 4

Анализ матери на COVID-19 **отрицательный**

Анализ новорожденного на COVID-19 ожидается отрицательный

Если еще госпитализированы:

- соблюдайте меры предосторожности, против контактной и каплевой передачи пока не разрешатся инфекции, вызывающие симптомы у матери
- свяжитесь с органами контроля и профилактики инфекций для дальнейшего плана
- обычный уход за младенцем и планирование выписки

Если выписаны до того, как стали известны результаты:

- свяжитесь с семьей и сообщите результаты

Анализ матери на COVID-19 **положительный**

Если еще госпитализированы:

- Соблюдайте предосторожности против контактной и каплевой передачи вируса
- если у матери/родственников подтвержден COVID-19, они не могут посещать ОРИТН, пока инфекция не разрешится
- Планируйте раннюю выписку матери с ребенком, если они хорошо себя чувствуют, и снабдите инструкциями, которым надо следовать в случае изменения состояния
- мать может кормить грудью, при условии соблюдения гигиены рук и ношения маски во время кормления
- Разместите ребенка на расстоянии 2 метров от матери, в то время, когда она не осуществляет уход за ним
- сообщите в органы здравоохранения перед выпиской

Если выписаны до того, как стали известны результаты:

- МОН (Medical officer of Health) / My Research Human Protocols ([MRHP](#)) сообщает семье результаты, оценивает текущее состояние и подтверждает следование инструкциям. Органам здравоохранения проверить результаты в [Netcare](#) (электронная база мед. карт) перед визитом к пациенту домой

Анализ новорожденного на COVID-19 **отрицательный**

Анализ младенца на COVID-19 **положительный**

Если выписаны: домашний уход за новорожденным

НОВОРОЖДЕННЫЙ БЕЗ СИМПТОМОВ и МАТЬ НЕ СПОСОБНА ЗА НИМ УХАЖИВАТЬ

Ребенок родился у матери с подозрением или подтвержденным COVID-19, которая, в силу своих симптомов НЕ способна самостоятельно заботиться о новорожденном.

- Соблюдайте меры предосторожности против контактной и капельной передачи, если не требовалась реанимация/иные, генерирующие аэрозоль процедуры (медицинская маска с визором или медицинская маска, щиток для лица/очки, халат и перчатки)
- Соблюдайте меры предосторожности против контактной и капельной передачи, с использованием маски N95, если требовалась реанимация или иные, генерирующие аэрозоль процедуры (реанимационная команда надевает маски N95, щиток для лица/очки, халат и перчатки)

Бессимптомный новорожденный и мать, которая **не может** осуществлять уход за ним.

Мазок из носоглотки берется у матери только с подозрением на COVID-19.

Мазок из носоглотки берется у новорожденного.

Если у новорожденного появляются **симптомы**, см.стр 4

- Разделите новорожденного с матерью после родов
- Соблюдайте меры предосторожности против контактной и капельной передачи вируса по отношению и к матери и к ребенку, пока они находятся в больнице
- Следите за симптомами у новорожденного – снимайте показатели жизненно-важных функций каждые 4 часа
- Планируйте раннюю выписку ребенка, если он разделен с матерью и хорошо себя чувствует, и снабдите инструкциями, которым надо следовать в случае изменения состояния ребенка.

Анализ матери на COVID-19 **отрицательный**
Анализ новорожденного на COVID-19 ожидается отрицательный

Анализ матери на COVID-19 **положительный**

- соблюдайте меры предосторожности против контактной и капельной передачи по отношению к матери и ребенку, пока не разрешатся инфекции, вызывающие симптомы у матери или пока один или оба лежат в стационаре
- свяжитесь с органами контроля и профилактики инфекций для разработки дальнейшего плана
- обычный уход за младенцем и планирование выписки

Если выписка произошла до того, как стали известны результаты:

- свяжитесь с семьей и сообщите результаты

- Соблюдайте меры предосторожности против контактной и капельной передачи вируса по отношению к матери и ребенку
- Планируйте раннюю выписку матери с ребенком, если они хорошо себя чувствуют, и снабдите инструкциями, которым надо следовать в случае изменения состояния матери или ребенка

- мать может кормить грудью, при условии соблюдения гигиены рук и ношения маски во время кормления
- если ребенок по какой-то причине переведен в ОРИТН, и если у матери/родственников подтвержден COVID-19, они не могут посещать ОРИТН, пока инфекция не разрешится

- свяжитесь с органами здравоохранения перед выпиской

Если выписка произошла до того, как стали известны результаты:

- сообщите семье результаты, оцените текущее состояние и подтвердите выполнение инструкций.

- Если мать поправилась и может осуществлять уход за ребенком: она может кормить грудью, при условии соблюдения гигиены рук и груди и ношения медицинской маски во время кормления

- Ребенок должен находиться в одной комнате с матерью на расстоянии 2 метров от нее, в то время, когда она не осуществляет уход за ним

Анализ новорожденного на COVID-19 **отрицательный**

Анализ новорожденного на COVID-19 **положительный**


Если выписаны: домашний уход за новорожденным

Дополнительная психологическая поддержка для семьи младенца с положительным анализом на COVID-19. Медицинские работники обращаются с грудным молоком в соответствии с обычными протоколами, как с другими телесными жидкостями.

Ссылка: [Chinese expert consensus on the perinatal and neonatal management for the prevention and control of the 2019 novel coronavirus infection \(First edition\)](https://doi.org/10.21037/atm.2020.02.20) Ann Transl Med 2020 | dx.doi.org/10.21037/atm.2020.02.20

Ведение новорожденных с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

НОВОРОЖДЕННЫЙ С СИМПТОМАМИ



*Дополнительная психологическая поддержка для семьи младенца с положительным анализом на COVID-19. Медицинские работники обращаются с грудным молоком в соответствии с обычными протоколами, как с другими телесными жидкостями.